

# DOXY 100 - DOXY 200

## Doxycycline

### FORMES ET PRESENTATIONS :

- **Comprimés sécables à 100 mg** : boîtes de 20 sous plaquettes thermoformées de 10;
- **Comprimés sécables à 200 mg** : boîtes de 10 sous plaquettes thermoformées de 10 .

### COMPOSITION :

Comprimés 100 mg	P . cp	P . boîte
Doxycycline(D.C.I) monohydraté exprimé en base	100mg	2g
Comprimés 200 mg	P . cp	P . boîte
Doxycycline(D.C.I) monohydraté exprimé en base	200mg	2g

Excipients : (communs) Aérosil, Avicel, Stéarate de Magnésium.

### PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :

Antibactérien à usage systémique.  
La doxycycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

### INDICATIONS :

- Brucellose, pasteurellose, rickettsiose, fièvre Q .
- Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes .
- Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophtalmiques à chlamydiae .
- Gonococcie .
- Infection ORL et bronchopulmonaire à Haemophilus influenzae .
- Tréponèmes (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines) .
- Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose) .
- Acné .
- Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

■ **POSOLOGIE :**  
La posologie que nous vous présentons est donnée à titre indicatif, votre médecin peut juger utile de la modifier pour l'adapter à votre cas personnel .

■ **CONFORMEZ-VOUS STRICTEMENT À SON ORDONNANCE .**

#### ● **Adulte :**

- Sujet de poids > 60kg : 200mg/jour en une prise.
- Sujet de poids < 60kg : 200mg 1e premier jour, 100mg les jours suivants en une prise .

#### ■ **Cas particuliers :**

- \* Gonococcies aiguës :
- Adulte de sexe masculin : 300mg 1e 1er jour (en 2 prises) suivis de 200mg par jour pendant 2 à 4 jours ou un traitement minute de 500mg ou de 2 doses de 300mg administrées à une heure d'intervalle .
- Adulte de sexe féminin : 200mg par jour.
- \* Syphilis primaire et secondaire : 300mg par jour en trois prises pendant au moins 10 jours.
- \* Urétrite non compliquée, endocervicite, rectite, dues à Chlamydia trachomatis: 200mg par jour pendant au moins 10 jours .
- \* Acné : 100 mg par jour pendant au moins 3 mois. Dans certains cas, un traitement à demi-dose peut être utilisé.
- \* Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires : 100 mg par jour pendant 3 mois.

- **Enfants de plus de 8 ans:** 4mg/kg/j en 2 prises .

# DOXY 100 - DOXY 200

## Doxycycline

### SHAPES AND PRESENTATIONS:

- **Scored tablet of 100mg:** box of 20 under thermoformed alveolar patches;
- **Scored tablet of 200mg:** box of 10 under thermoformed alveolar patches.

### COMPOSITION:

Tablets of 100mg	p.tablet	p.box
Doxycycline monohydrate	100mg	2g
Tablets of 200mg	p.tablet	p.box
Doxycycline monohydrate	200mg	2g

Excipients: Areosil, avicel, magnesium stearat.

### PHARMACOLOGIC PROPERTIES:

Antibacterial for systemic use.  
Doxycycline is an antibiotic of the tetracycline family.

### INDICATIONS:

- Brucella, pasteurella, rickettsia, Q fever.
- Pulmonary, genito-urinary infections caused by mycoplasma.
- Pulmonary, genito-urinary and ophthalmic infections caused by chlamydiae.
- Gonococci.
- Bronchopulmonary and respiratory tract infections caused by the Haemophilus influenzae.
- Treponema (In syphilis, tetracyclines are indicated only in case of hypersensitivity to betalactamins).
- Spirochaete (Lyme disease, leptospirosis).
- Acne.
- Rosacea in skin or eye manifestations.

### POSOLGY AND MODE OF ADMINISTRATION:

#### ■ **POSOLGY :**

This dosage is given for information, your doctor can change this dosage if he sees that it will be suitable for your case.  
**YOU SHOULD STRICTLY FOLLOW THE DOSAGE INDICATED IN HIS PRESCRIPTION.**

#### ● **Adult:**

- Body weight > 60kg: 200mg per day in one administration.
- Body weight < 60kg: 200mg the first day, then reduce the dose to 100mg in one administration.

#### ■ **Special cases:**

- \* Acute gonococci:
- Adult male: 300mg the first day (in 2 administrations) and then, reduce the dose to 200mg per day for 2 to 4 days or minute treatment consisting on 500mg or administration of 2 doses of 300mg, one hour between the 2 doses should be respected.
- Adult female: 200mg per day.
- \* Primary and secondary syphilis. 300mg per day divided into 3 administrations, this dosage is recommended for at least 10 days.
- \* Uncomplicated urethritis, endocervicitis, rectitis caused by Chlamydia trachomatis: 200mg per day during a period of 10 days at least.
- \* Acne: 100 mg per day during 3 months. In some cases, a half-dose treatment can be used.
- \* Rosacea in skin or eye manifestations: 100 mg per day during 3 months.
- **Children whose age is over 8 years:** 4mg / kg / day divided into 2 taking.

# دوكسي 100 - دوكسي 200

## دوكسيسكلين

### الشكل والتقديم :

- أقراص 100 مغ قابلة للانحطاط: علبة ذات 20 قرصا :
- أقراص 200 مغ قابلة للانحطاط: علبة ذات 10 أقراص .

### التركيبية :

أقراص ذات 100 مغ	للقرص الواحد	في العبوة
دوكسيسكلين مونوهيدرات بما يوافق من الدوكسيسكلين	100 مغ	2 غ
أقراص ذات 200 مغ	للقرص الواحد	في العبوة
دوكسيسكلين مونوهيدرات بما يوافق من الدوكسيسكلين	200 مغ	2 غ

سواغ :ايروسيل، أفيسال، ستيراتات المغنسيوم .

### الخصائص الدوائية:

مضاد للجراثيم للاستعمال الشامل.  
الدوكسيسكلين هو مضاد حيوي من فئة التتراسكلين.

### دواعي الاستعمال

- الجمعي المتوجع، داء الباستوريلا، الرickettsias، حمى س.
- التهابات الرئة، الجهاز التناسلي و البولي الناتجة عن البكتيريا المعفورة.
- التهابات الرئة، الجهاز التناسلي و البولي و الجهاز البصري الناتجة عن البكتيريا المتدفرة.
- السيلان.
- التهاب الأنف و الحنجرة و التهابات القصيبية الرئوية الناتجة عن البكتيريا المستدمية النزلية.
- الإصابة بأمراض ناتجة عن البكتيريا الملولبة ( في مرض الزهري، يستعمل التتراسكلين في حالات الحماسية لبينا لاكتامات).
- اللولبيات (مرض لايم، داء البريميات).
- حب الشباب .
- داء الوردية في مظاهره الجلدية أو البصرية.

### المقادير وطريقة الاستعمال:

#### ■ **المقادير:**

هذه المقادير مقدّمة لكم بصفة تقريبية ، ولطبيبيكم المباشر تحديد الجرعة الملائمة لحالتكم .  
تقدّموا تماما بوصفة الطبيب .

#### ● **للبالغين :**

- إذا كان الوزن أكثر من 60 كغ : 200 مغ في اليوم في جرعة واحدة .
- إذا كان الوزن أقل من 60 كغ : 200 مغ في اليوم الأول، 100 مغ في اليوم للأيام الموالية.

#### ■ **حالات خاصة :**

- \* الفونوكوكسي العادة :
- للبالغين من الرجال : 300مغ في اليوم الأول على جرعتين ثم 200مغ في اليوم وذلك بين يومين أو 4 أيام أو تقديم 500مغ في جرعة واحدة أو على جرعتين متتاليتين بين الأولى والثانية ساعة ويأخذ في كل جرعة 300مغ .
- للبالغين من النساء : 200مغ في اليوم .
- \* الزهري : 300 مغ على 3 جرعات لمدة 10 أيام على الأقل.
- \* التهاب الإحليل غير المعقد، التهاب باطن العنق، التهاب المستقيم، و الناجمة عن المتدفرة الحثوية : 200مغ يوميا لمدة 10 أيام على الأقل .
- \* حب الشباب : 100 مغ في اليوم لمدة 3 أشهر، في بعض الحالات يمكن إستعمال نصف جرعة.
- \* داء الوردية في مظاهره الجلدية أو البصرية : 100مغ/ يوم لمدة 3 أشهر .
- **الأطفال ابتداء من 8 سنوات :** 4مغ/كغ/ اليوم على جرعتين .

#### ■ MODE D'ADMINISTRATION :

Administration au milieu d'un repas avec un verre d'eau et au moins une heure avant le coucher en position debout ou assise.

#### CONTRE-INDICATIONS :

##### Absolues :

- Hypersensibilité aux tétracyclines.
- Enfant de moins de 8 ans .
- Association avec les rétinoïdes administrés par voie générale .
- Femme enceinte à partir du 2ème trimestre de la grossesse.

##### Relatives :

- Pendant l'allaitement.

#### MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition directe au soleil et aux UV pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées à type d'érythème.

- la prise de doxycycline doit se faire au cours d'un repas.

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS (telque: rétinoïdes, Anticonvulsivants, Anticoagulants oraux,...), IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

##### Grossesse :

- Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser les cyclines pendant le premier trimestre de la grossesse.
- À partir du deuxième trimestre de la grossesse, l'administration de cyclines est contre-indiquée.

##### Allaitement :

En cas de traitement par ce médicament, l'allaitement est déconseillé.

#### EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs: nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie...
- Réactions allergiques: urticaire, rash, prurit...
- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail en cas d'administration chez les enfants au dessous de 8 ans.
- Réactions de photosensibilisation.
- Possibilité de Troubles hématologiques (anémie hémolytique, thrombocytopenie, neutropénie, eosinophilie) .

Tableau A Liste 1

A.M.M :

922 311 1  
922 311 2

#### CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Laboratoires GALPHARMA  
3054 Sfax - TUNISIE

#### ■ MODE OF ADMINISTRATION :

Take this drug during the meals with one full glass of water, at least one hour before sleeping in standing or sitting position.

#### CONTRA- INDICATION :

##### Absolute:

- Hypersensitivity to tetracyclines.
- Child whose age is under 8 years.
- Association with retinoids taken by oral way.
- Pregnant woman from the second trimester of pregnancy.

##### Relative:

- During breast-feeding.

#### WARNING AND PRECAUTIONS OF USE:

-Because of risk of photosensitivity, it's recommended to avoid direct exposure to sunlight and UV radiations during the treatment by this drug. The treatment must be interrupted in case of Cutaneous affections such as erythema.

-Doxycycline should be taken during the meal.

#### DRUG INTERACTIONS:

IN ORDER TO AVOID POSSIBLE INTERACTIONS WITH OTHER DRUGS,(such as : retinoids, anticonvulsants, oral anticoagulants...) YOU MUST INFORM YOUR DOCTOR OR PHARMACIST ABOUT ANY OTHER CURRENT TREATMENT.

#### PREGNANCY AND BREAST- FEEDING:

##### PREGNANCY:

- As a precautionary measure, it's preferable to not use the cyclin during the first trimester of pregnancy.
- Using these medicines during the second trimester of pregnancy is contraindicated.

##### BREAST-FEEDING:

In case of treatment with this drug, breast-feeding is disadvised.

#### UNDESIRABLE EFFECTS :

- Digestive troubles: nausea, epigastralgia, diarrhoea, anorexia...
- Allergic reactions: urticaria, rash, prunitus...
- Dental dyschromia or hypoplasia when this drug is used by children under 8 years .
- Photosensitivity reactions.
- Possibility of haematological disorder (haemolytic anaemia, thrombocytopenia, neutropenia, eosinophilie).

Table A List 1

M.A:

922 311 1  
922 311 2

#### THIS IS A MEDICAMENT

- A medication is not a product as others.
- A medication is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist are experts in medication, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep medicines out of reach of children.



GALPHARMA Laboratories  
3054 Sfax - TUNISIA

#### ■ طريقة الاستعمال :

يعطى هذا الدواء في وسط الطعام مع كثير من الماء وعلى أقل تقدير ساعة قبل النوم في وضعية جلوس أو وقوف.

#### موانع الاستعمال :

- الحساسية لمادة التتراسيكلين .
- الأطفال دون 8 سنوات .
- الجمع بينه وبين الريتويد المأخوذ عن طريق الفم .
- المرأة الحامل ابتداء من الثلثة الثانية من الحمل .

نسبية:

- أثناء الإرضاع.

#### التحذيرات واحتياطات الاستعمال :

- نظرا لمخاطر الحساسية للضوء فإنه ينصح بتفادي التعرض المباشر للشمس والأشعة فوق البنفسجية أثناء العلاج الذي يجب الانقطاع عنه في حالة ظهور علامات جلدية من نوع الاحمرار.

- يفضل تناول الدواء خلال وجبات الطعام.

#### التفاعلات الدوائية:

حتى تتجنب التفاعلات بين عدة أدوية (مثل الريتويد، مضاد الإختلاج، مضادات التجتر المأخوذة عن طريق الفم...)، فإنه يتعين حتما إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر تستعملونه.

#### الحمل والإرضاع :

الحمل:

- من باب الوقاية، ينصح بعدم استعمال السيكلين في الثلثة الأولى من الحمل .
- لا يستعمل السيكلين ابتداء من الثلثة الثانية من الحمل .

الإرضاع :

- لا ينصح بالإرضاع عند استعمال هذا الدواء .

#### التأثيرات الجانبية :

- احتمال اضطرابات هضمية: غثيان، آلام في المعدة، اسهال، نقص الشهية...
- ردود فعل ناشئة عن الحساسية: الشرى، طفح جلدي، بقع حمراء على الجلد...
- تلون غير عادي للأسنان وقصور في نموها في حالة إعطاء هذا الدواء لطفل دون سن الثامنة.
- تحسس ضيائي .
- إمكانية اضطرابات دموية (فقر الدم الإحلالي، نقص الصفحات الدموية، نقص الكوريات المعدلة، كثرة الخلايا الأيزونوفيلية في الدم) .

اللائحة أ - القائمة أ

التأشيرة عدد :  
922 311 1  
922 311 2

#### إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للمخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلي هما الخياران بالدواء وتفضعه وصوره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تتكرر الوصفة ولا تزر عليها بدون استشارة الطبيب .
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .



مخابير فالفارما  
3054 صفاقس - تونس